

A) 患者基本情報

氏 名： \_\_\_\_\_

年 齢： \_\_\_\_\_ (月 齢 \_\_\_\_\_)

性 別： 男 女

患者番号： \_\_\_\_\_

病院到着日： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

受傷日時： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推定 不明

外傷原因： 不慮の事故 自損（自殺企図） 傷害（第三者行為） 労働災害

その他 不明

外傷分類： 未入力 鈍的 鋭的 熱傷 その他 不明

## B) 病院前情報

搬送経路： 現場から直接救急搬送 医療機関から転送 その他 不明

搬送方法： 救急車 ドクターカー ドクターヘリ その他ヘリ 自家用車

独歩 その他 不明

消防機関名： \_\_\_\_\_救急隊

覚知日時： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

現着日時： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

傷病者接触日時： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

現発日時： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

病着日時： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

搬送時間： \_\_\_\_\_分

救急救命士同乗： あり なし 不明

医師同乗： あり なし 不明

受傷の目撃： あり なし 不明

病院前処置： 酸素吸入 頸椎カラー バックボード ショックパ  
ンツ 副子 圧迫止血

エアウェイ挿入（経鼻・経口） 気道確保（LM・LT・EGTA・

Combi・気管挿管） 人工呼吸 胸骨圧迫 除細動 静脈路確保

薬剤投与 その他 施行せず 不明

救急隊到着時の所見：

心停止： なし あり 不明， 呼吸停止： なし あり 不明

収縮期血圧： \_\_\_\_\_mmHg 未入力（記載） 測定不能 測定せず不明

拡張期血圧： \_\_\_\_\_mmHg 未入力（記載） 測定不能 測定せず不明

脈拍数： \_\_\_\_\_回／分 未入力（記載） 測定不能 測定せず不明

呼吸数： \_\_\_\_\_回／分 未入力（記載） 測定不能 測定せず不明

現場 JCS： \_\_\_\_\_ 不明， 現場 GCS： E\_\_\_\_ 不明 V\_\_\_\_ 不明 M

不明 合計 \_\_\_\_ 不明

転送情報（転送の場合のみ） 初期消防機関名： \_\_\_\_\_ 救急隊

転送元分類： 一次救急施設 二次救急施設 救命救急センター

その他 不明

転送理由： 処置不能 満床 専門医不在 症状悪化 その他

不明

転送元收容日時： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

転送元出発日時： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

経由病院数： \_\_\_\_\_ヶ所

受傷から当施設搬入までの時間： \_\_\_\_\_時間 \_\_\_\_\_分

## C) 受傷機転と病歴

### 1. 受傷機転

#### A) 鈍的外傷

交通事故： 四輪車両運転者 四輪車助手席同乗 四輪車後部座席同乗

自動二輪車運転 自動二輪車同乗者 自転車走行中  
歩行者 その他の車両乗車中

鉄道関連： 列車に轢過 列車に接触 その他

墜落，転落： 墜落（高所からの自由落下） 転落（斜面・階段等から転げ落ちる）

機械による外傷： 回転体機械 プレス機 その他

落下物，爆発物等： 落下物 飛来物 爆発

挟 圧： 重量物による挟圧 家屋倒壊 土砂崩れ その他

その他： 転倒 暴力行為 スポーツ中の事故 農作業中の事故  
工事現場での事故 その他

#### B) 鋭的外傷

刺創 切創 銃創 杵創（刺杭創） その他

#### C) 熱 傷

火炎 爆発 熱湯 高温液体 化学物質 電撃 雷撃 その他

#### D) その他

縊頸 溺水（溺没） 放射線障害 その他

### 2. 病歴の聴取

受傷前飲酒： なし あり 不明

最終食事： ＜2時間前 2～6時間前 6～12時間前 不明

アレルギー： なし あり（薬剤 \_\_\_\_\_，造影剤，麻酔薬，食物 \_\_\_\_\_） 不明

常用薬： なし あり（抗凝固薬 抗血小板薬 ステロイド 免疫抑制薬 その他 \_\_\_\_\_）  
不明

特殊状態： 妊娠中 透析中（血液・腹膜） 緑内障 その他

既往歴： 既往疾患なし 不明

循環器疾患： 虚血性心疾患 心不全 高血圧 その他

呼吸器疾患： 気管支喘息 COPD 結核 その他慢性肺疾患

消化器疾患： 肝硬変 慢性肝炎 消化性潰瘍 炎症性腸疾患

その他

代謝性疾患： 糖尿病 高度肥満 その他

中枢性・精神疾患： 脳血管障害(片麻痺等) 精神疾患 痴呆 精神発達遅滞 その他

免疫不全, 癌など： HIV・AIDS 悪性腫瘍治療中 血液疾患治療中  
その他

## D) Primary Survey

### 初療室入室時バイタルサイン

心停止： なし あり 不明, 呼吸停止： なし あり 不明

血圧： \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_mmHg

脈拍数： \_\_\_\_\_回/分

呼吸数： \_\_\_\_\_回/分

体温： \_\_\_\_\_°C (腋窩・鼓膜・直腸・他)

GCS： E (1・2・3・4) V (1・2・3・4・5) M (1・2・3・4・

5・6) GCS合計 \_\_\_\_\_, JCS： \_\_\_\_\_

【医師診察開始時間： 20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測  
不明】

### 1. A：気道の評価・確保と頸椎保護

会話： 可能 不可能, 口腔内異物： なし あり (□除去完了)

酸素投与 (100% 10~15 L/分)： 投与中 あり なし

気管挿管 適応： なし あり 既に挿管済 施行： なし あり

(経口, 経鼻)

緊急気道確保 適応： なし あり 施行： なし 輪状甲状靱帯穿刺・切

開 気管切開

頸椎カラー装着： なし あり 既に装着済

### 2. B：呼吸の評価と致命的な胸部外傷の処置

呼吸数： \_\_\_\_\_回/分 不明, SaO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_%

呼吸音の左右差： なし あり 胸郭運動の左右差： なし あり

気管偏位： なし あり 皮下気腫： なし あり

致命的な胸部外傷： なし あり 胸腔ドレーンの挿入： なし あり

(左・右)

### 3. C：循環の評価および蘇生と止血

橈骨動脈蝕知： 良好 微弱 不可, 末梢冷感： なし あり, 冷

汗： なし あり

収縮期血圧： \_\_\_\_\_mmHg (□心拍あるも血圧測定不能時 □脈拍触れず)

拡張期血圧： \_\_\_\_\_mmHg (□触診のため記載なし)

心拍数： \_\_\_\_\_回/分 □不明

明らかな外出血： □なし □あり □既に処置済(部位 \_\_\_\_\_)

一時止血処置： □なし □あり(部位 \_\_\_\_\_)

静脈路確保： □なし □あり(部位1 \_\_\_\_\_)(□末梢静脈 □中心静脈 □  
骨髄内) □既に確保済

□あり(部位2 \_\_\_\_\_)(□末梢静脈 □中心静脈

□骨髄内) □既に確保済

急速輸液に対する反応(輸液製剤名 \_\_\_\_\_)

輸液開始日時： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 □推測 □不明

輸液量 1000ml： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 □推測 □不明

□安定 □一過性の安定のみ □安定せず

輸液量 2000ml： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 □推測 □不明

□安定 □一過性の安定のみ □安定せず

輸血必要性： □なし □あり(MAP \_\_\_\_\_単位, FFP \_\_\_\_\_単位)

輸血開始日時： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 □推測 □

不明

アルブミン製剤の使用： □なし □あり(製剤名 \_\_\_\_\_)

昇圧剤・カテコラミンの使用： □なし □あり(薬剤  
名 \_\_\_\_\_)

ポータブル単純X線写真： □胸部 □骨盤 □施行せず

実施時間： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 □推測 □不明

FAST： □陰性 □陽性(心嚢, モリソン, 脾周囲, ダグラス) □施行せず □不

明

実施時間： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 □推測 □不明

#### 4. D：生命を脅かす中枢神経障害の評価

GCS： E(1・2・3・4) V(1・2・3・4・5) M(1・2・3・4・5・

6) GCS合計： \_\_\_\_\_ □不明

JCS： \_\_\_\_\_ □不明

瞳孔径： 左 \_\_\_\_\_mm 右 \_\_\_\_\_mm, 左右差： □なし □あり □不明

対光反射： 左 □なし □あり □不明, 右 □なし □あり □不明

片麻痺： なし あり（左，右） 不明

切迫するD： なし あり

### 5. E：脱衣と体温管理

全身の着衣除去： なし あり 除去済 保温： なし あり  
施行済

尿道留置カテーテルの挿入： なし あり 胃管の挿入：  
なし あり

### 初期評価終了時のバイタルサイン

【20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明】

血圧： \_\_\_\_/\_\_\_\_mmHg

脈拍数： \_\_\_\_回/分

呼吸数： \_\_\_\_回/分

体温： \_\_\_\_℃（腋窩・鼓膜・直腸・他）

GCS： E（1・2・3・4） V（1・2・3・4・5） M（1・2・3・4・5・6） GCS合計 \_\_\_\_, JCS： \_\_\_\_

E) Secondary Survey (図示を併用)

身長： \_\_\_\_\_ cm 推測 不明, 体重： \_\_\_\_\_ kg 推測 不明

1. 頭 部

創傷： なし あり 打撲痕・血腫： なし あり  
頭部陥没： なし あり 顔面骨の変形： なし あり  
頭蓋底骨折のサイン： なし あり ( ブラックアイ バトル徴候)  
耳孔からの出血：なし あり (左・右) 鼻孔からの出血：  
なし あり (左・右)  
口腔内の出血：なし あり 歯牙損傷：なし あり

2. 頸 部

創 傷： なし あり 打撲痕・血腫： なし あり  
血 痰： なし あり 嗄 声： なし あり  
拍動性腫瘍： なし あり 皮下気腫： なし あり  
頸静脈怒張： なし あり 気管偏位： なし あり  
後頸部の圧痛：なし あり

3. 胸 部

創 傷： なし あり 打撲痕・血腫： なし あり  
圧 痛： なし あり 呼吸音左右差：なし あり  
胸郭運動左右差：なし あり 動 揺 性 ( flail  
chest)：なし あり  
皮下気腫：なし あり

4. 腹 部

創 傷： なし あり 打撲痕・血腫： なし あり  
腹部膨満：なし あり 圧 痛：なし あり  
腹膜刺激症状：なし あり (筋性防御, 反跳痛)  
腸 音：正常 亢進 低下・消失

## 5. 骨 盤

創 傷： なし あり      打撲痕・血腫： なし あり  
圧 痛： なし あり      動揺性： なし あり  
尿道出血： なし あり      直腸診： 正常 異常 施

行せず

## 6. 四 肢

創 傷： なし あり      打撲痕・血腫： なし あり  
変 形： なし あり      圧 痛： なし あり  
末梢動脈触知： なし あり

## 7. 神 経

GCS： E (1・2・3・4) V (1・2・3・4・5) M (1・2・3・4・5・

6) GCS合計： \_\_\_\_\_ 不明

JCS： \_\_\_\_\_ 不明

瞳孔径： 左 \_\_\_\_\_mm 右 \_\_\_\_\_mm 左右差： なし あり 不明

対光反射： 左 なし あり, 右 なし あり

眼球運動異常： 左 なし あり, 右 なし あり

舌偏位： なし あり 不明

片麻痺： なし あり 不明

四肢筋力低下： なし あり      四肢知覚異常： なし あり

## 詳細観察終了時のバイタルサイン

【20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分 推測 不明】

血圧： \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_mmHg

脈拍数： \_\_\_\_\_回/分

呼吸数： \_\_\_\_\_回/分

体温： \_\_\_\_\_℃ (腋窩・鼓膜・直腸・他)

GCS： E (1・2・3・4) V (1・2・3・4・5) M (1・2・3・4・

5・6) GCS合計 \_\_\_\_\_, JCS： \_\_\_\_\_

## F) 検査関連

### 1. 単純X線写真 (図示を併用)

胸部 X-P (正面) : 所見

骨盤 X-P (正面) : 所見

頸椎 X-P (正面・側面・開口位) : 所見

頭部 X-P (正面, 左側面, 右側面, Towne, Waters) : 所見

その他 X-P : 所見

### 2. CT 写真 (図示を併用)

頭部・顔面・頸部 : 造影剤 : なし あり

所見

実施時間 : 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

体幹部 (胸部・腹部・骨盤部) : 造影剤 : なし あり

所見

実施時間 : 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

### 3. 超音波検査 (図示を併用)

心臓

腹部

### 4. 血液検査

末梢血

生化学

凝固系

その他 (血中アルコール濃度など)

血液ガス (条件)

### 5. その他

尿検査

12 誘導心電図

その他

【初療室診療終了時間： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推  
測 不明】

## G) 治療関連

### 1. 根治的治療の方針（初療室での判断）

入院経過観察

IVR (Interventional Radiology)

緊急血管造影： 施行せず 頭部 頸部 胸部 腹部 骨盤

脊椎 その他

開始時間： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

塞栓術 (TAE)： 施行せず 施行 (塞栓血管名 \_\_\_\_\_)

血管内ステント留置術： 施行せず 施行 (留置血管名 \_\_\_\_\_)

緊急手術

施行せず

\_\_\_\_\_ 施行 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ 術式 \_\_\_\_\_)

ER 穿頭 ER 開胸 ER 開腹 穿頭 開頭 頸椎牽引(観血的)

開胸 開腹 鏡視下手術 骨折手術 血行再建 指肢再接着 止血

その他 不明

開始時間： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

### 2. 頸椎固定解除

頸椎カラー： 固定継続 除去 (固定解除)

固定解除時間： 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_時\_\_\_\_分 推測 不明

### 3. 感染予防

抗菌薬投与： 施行 (薬剤名 \_\_\_\_\_) 施行せず 不明

破傷風予防： トキソイド テタノブリン 施行せず 不明

### 4. その他

表 A5-1 外傷診療録の用途・目的

1. 日常の外傷診療の記録である
2. Trauma registry (JTDB) へのデータ集積を容易にする
3. 臨床研修医などへの教育ツールとして活用される
4. 多施設共同研究を行う際の基礎データなどとして活用される